ROSA INDICA

Multipetala. (Voyez p. 38 de ce volume, var. ..)

R. germinibus ovatis glabris; pedunculis subhispidis; foliolis acutis, undulatis; caule petiolisque aculeatis. (N.)

R. (Semperflorens) duplex rosea. Du P. Gymn. Ros. in Thy. R. Candolleana, p. 19, série 30, n° 4.

R. (Semperflorens) var. 3. Nouv. Duhamel, vol. 7. р. 24. Rosier du Bengale à fleurs très-doubles. Guerr. Alm. des Roses, p. 25.

LE ROSIER DU BENGALE

(Cent feuilles.)

DESCRIPTION.

Rosier qui s'élève en un buisson touffu, à la hauteur de trois ou quatre pieds, même encore plus, dans les terrains frais et humides. Ses branches vertes et glabres sont armées d'aiguillons forts, crochus, très-dilatés à leur base, d'une couleur rougeâtre. Les feuilles se composent de cinq folioles, ovales-arrondies, vertes en-dessus, plus pâles en-dessous, luisantes, d'une consistance ferme, souvent ondulées, et terminées par une pointe particulière d'une forme très-remarquable : elles sont portées par un pétiole tomenteux, muni de plusieurs petits aiguillons crochus de la couleur de ceux des tiges. Les fleurs, légèrement odorantes, doubles, mais un peu moins que celles de la Cent-feuilles ordinaire, de couleur rose un peu plus foncée que celle des pétales du R. Indica vulgaris, sont disposées par deux ou trois à l'extrémité des rameaux. Les pédoncules com-

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300